

告示	番号	12	慢性心疾患
	疾病名	10 及び 11 に掲げるもののほか、冠動脈起始異常	

28 及び 29 に掲げるもののほか、冠動脈起始異常

そのた、かんどうみやくきしいじょう

概念・定義

左冠尖から左冠動脈が、右冠尖から右冠動脈が出るのが正常であるが、それ以外の形態を全て冠動脈起始異常という。冠動脈が肺動脈から起始する異常は別項で扱う。単一冠動脈、左冠動脈洞（左冠尖）からの右冠動脈起始、右冠動脈洞（右冠尖）からの左冠動脈起始がある。起始異常の冠動脈が大動脈と主肺動脈との間を走行することで、心筋虚血、心筋梗塞を起こすことがある。

症状

冠動脈の肺動脈起始以外に、単一冠動脈、左冠動脈洞（左冠尖）からの右冠動脈起始、右冠動脈洞（右冠尖）からの左冠動脈起始がある。特に、後者の2つでは起始異常の冠動脈が大動脈と主肺動脈との間を走行することで、心筋虚血、心筋梗塞を起こすことがある。特に、右冠動脈洞（右冠尖）からの左冠動脈起始では運動時の突然死の危険がある。

治療

冠動脈の手術を行うことがある。

抜粋元：http://www.shouman.jp/details/4_24_30.html